


手術を受けられる方へ



当院では、
手術後に発症しやすい
深部静脈血栓症を防ぐ目的で
弾力性ストッキングの着用を
ご説明しております。

深部静脈血栓症とは

手術中～後の一時的に動けない状態の時、血液の流れがゆっくなりとなり、下肢の太い静脈(深部静脈)に血流のかたまり(血栓)ができて、足の血液が心臓に戻りにくくなる病気です。そのため、急に足が腫れ、皮膚も赤紫色に変化します。




肺塞栓症って、どんな病気?

足の深部静脈にできた血栓が剥がれて血流にのり、肺動脈に詰まる病気です。

多量の血栓が詰まると肺の働きが損なわれ、呼吸困難や胸痛などをひきおこし、ときには心肺停止をきたす場合もあります。

◎長時間の飛行機旅行のあとなどに起こる「エコノミクス症候群」(ロングフライト血栓症)も同じ病気です。

肺塞栓症予防には、深部静脈血栓症の発症を防ぐこと。



弾力性ストッキング




血液の流れを促進させる方法の1つに
弾性ストッキングの着用があります。

圧迫圧の段階的な変化により血流を促すストッキングです。副作用も少なく手軽に使用することができます。

欧米では一般的な予防法のひとつです。

サイズ	S	M	L	LL
色	白			



<http://www.yatsuo.or.jp>

ISO9001 認証取得 (地域医療連携室) 病院機能評価認定病院

富山県富山市八尾町福島7-42 (076)454-5000